

一、手術前準備及注意事項

1. 手術前應禁食 6-8 小時，包括開水亦不能飲用。
2. 須填寫手術同意書，有配偶者應得配偶之同意，未婚者應得同居人或法定代理人之同意，未滿十八歲者，須經監護人之同意。
3. 手術時應有家屬陪同，以便聯絡。

二、手術後注意事項

1. 手術後記得回家服藥。
2. 按醫師指示，一週後回來門診複查。
3. 至少靜養休息一天，兩三天內勿做粗重的工作如搬重物、拖地板等。
4. 手術後一星期內不可以有性生活，並請勿灌洗陰道。
5. 手術後一星期內可能有些點狀出血，若出血量比月經量多，或出血超過一週時，請立即回來門診複查。
6. 手術後二、三天內可能會有下腹疼痛，但若疼痛比月經痛更痛或有發燒時，請立即回來門診複查。
7. 若近期內不希望受孕，請記得避孕。
8. 手術後兩個月仍沒有月經來時，請回來門診複查。

三、藥物流產(RU486)

1. 須由醫師檢查確定為子宮內懷孕。
2. 需在懷孕 7 週內服藥。
3. 第一次服藥會有少量出血為正常，第二次服藥後完成藥物流產，第一天出血會比平常月經多一些，之後少量出血，約持續 10-14 天。
4. 服藥後一週須回診
5. 如有腹部劇烈疼痛，大量出血，發燒，嘔吐情形，須立即回診。